



VERNO™ 30Cu + 30Zn FG HNOJIVO ES



Typ hnojiva podľa Prílohy č. 1, Nariadenia ES a Rady č. 2003/2003:

E.2.3. Hnojivá pre listové hnojenie obsahujúce hlavné alebo druhotné živiny so stopovými prvkami

Zmesové hnojivo - percentuálny obsah živín:

Meď (Cu) v podobe oxidu medného (Cu ₂ O)	34,5%	[30% Cu]
Zinok (Zn) v podobe oxidu zinočnatého (ZnO)	37,3%	[30% Zn]

Balenie: 10 kg vrecia

Výrobca: Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485/43, 198 00 Praha 14

VERNO je kombinované **zmesové hnojivo** na báze medi a zinku pre listovú výživu rastlín, aplikované pre korekciu nedostatku medi a zinku. Obsahuje 30 % medi (Cu), 30 % zinku (Zn), menej než 5 % vápniku (Ca), menej než 5 % horčíku (Mg), menej než 5 % síry (S) a adjuvancia vyskytujúce sa v prírode.

VERNO obsahuje mikronizované častice oxidu medného (Cu₂O) a oxidu zinočnatého (ZnO), silne sa viaže na listy a povrchové časti rastlín, poskytuje zásobu pomaly sa uvoľňujúcej medi a zinku a poskytuje živiny vtedy, keď ich rastlina potrebuje.

VERNO je hladko sypký a v zásade bezprašný dispergovateľný granulát.

FORMULÁCIA:

Granule dispergovateľné vo vode ku korekcii nedostatku živín a k stimulácii rastu rastlín.

ODPORUČENÉ DÁVKOVANIE:

Obiloviny	200 – 500 g/ha v dobe odnožovania do začiatku stĺpkovania (fáza 21 – 25 BBCH) pri výraznom nedostatku živín. Aplikácia sa môže opakovať pred metaním (fáza 45 – 50 BBCH).
Repka olejnatá	500 g/ha v štádiu 4. listu repky
Strukoviny	200 – 500 g/ha pri výške rastlín 10 – 15 cm
Kukurica, dyne	500 g/ha ako pásový postrek pri siatí. Použiť 100 l vody na ha.
Ovocné stromy	0,5 – 1 kg/ha po žatve, najneskôr ale 14 dní pred opadaním listov.
Orechy	200 – 400 g/ha po žatve, behom vzniku púčikov na ďalšiu sezónu.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

VERNO je jedinečný, vysoko koncentrovaný granulát dispergovateľný vo vode, ktorý splňuje požiadavky na produkty priateľské k užívateľom a na nižšiu energetickú náročnosť pri preprave a manipulácii.

Naplňte nádrž do $\frac{3}{4}$ vodou a aplikujte príslušnú dávku, rozmiešajte. Verno je treba rozpustiť vo vode PRED pridaním adjuvantu či ďalšej prímеси!

DÁVKA VODY:

Poľné plodiny: 200 – 400 litrov vody na hektár, v závislosti na vybavení pre postrek.
Iné plodiny: použiť rovnaké množstvo vody, ako je zvyčajné pre dosiahnutie požadovaného pokrytia.

VERNO poskytuje lepšie pokrytie. Priľne lepšie, než väčšie častice. Má vynikajúcu priľnavosť a retenciu.

Používať len v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať odporučené dávky.



OCHRANNÉ OPATRENIA:

Uchovávať mimo dosah detí (S2). Skladovať na miestach k tomu určených, odolných mrazu, v uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív (S13). Pri manipulácii a postreku používať gumové rukavice. Zlikvidovať prázdne vrecia v súlade s predpismi stanovenými miestnymi orgánmi. Pri postreku zabrániť kontaminácii vodných zdrojov, a pokiaľ po pokrytí požadovaného územia nie je nádrž prázdna, aplikovať desaťnásobne zriedený postrek.

Kontaktné údaje výrobcu: Leading Farmers CZ, a.s. Klánovická 485/43 198 00 Praha 14 Zástupca pre Slovenskú republiku: Mobil: +421 911 875 202 www.Leadingfarmers.sk	Pôvod hnojiva: Nordox AS Østensjøveien 13 0661 Oslo/Norsko Tel.: +47 22 97 50 00 www.nordox.no
--	---